

## ARSENAL FARMACOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES ATENCION PRIMARIA DE SALUD AÑO 2015

### GRUPO 1

#### MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MODIFICAR LAS FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DEL MUSCULO ESTRIADO

##### 1.1. Anestésicos locales

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Lidocaína clorhidrato | sol. inyec. 2% 5 ml., carpule con o sin vasoconstrictor odont.<br>2%, gel 2% |
| Mepibacaína           | 2 o 3% AM  |

##### 1.2. Anestésico general

|          |  |
|----------|--|
| Propofol | sol. inyec. 10 mg/ml ( uso en carro de paro) |
|----------|--|

##### 1.2. Relajantes musculares

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Ciclobenzaprina     | comp 10 mg                 |
| Neostigmina         | sol. inyec. 0,5 mg/ml (#)  |
| Rocuronio bromuro   | sol. inyec. 10 mg/ml (#)   |
| Suxametonio cloruro | sol. inyec. 100 mg/5ml (#) |

(#) Uso en carro de paro

##### 1.3. Ansiolíticos e Hipnóticos

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Alprazolam      | comp. 0,25 mg - 0,5 mg            |
| Clonazepam      | comp. 0.5 mg -2 mg                |
| Clordiazepóxido | comp.10 mg.                       |
| Diazepam        | comp. 5 mg - 10 mg                |
| Lorazepam       | comp. 2 mg , sol. inyec. 4 mg (#) |
| Midazolam       | sol. inyec. amp 5mg/5ml (#)       |
| Midazolam       | sol. inyec. amp 15mg/ml (#) (&)   |
| Zopiclona       | comp. 7,5 mg                      |

(#) Uso en Servicio de Urgencia

(#) (&) Uso en Servicio de Urgencia y carro de paro

#### 1.4. Neurolépticos Antisicóticos

|                         |  |     |
|-------------------------|--|-----|
| Clorpromazina clorh.    | comp. 25 mg y 100 mg, sol inyec. 12,5 mg/ml, amp. 2 ml |     |
| Haloperidol             | comp. 1 g y 5 mg, sol. inyec 5 mg/ml, amp 1 ml (*) (&) |     |
| Risperidona             | comp 1mg y 3mg   | (&) |
| Tioridazina clorhidrato | grageas 25 mg y 100 mg , sol. oral 10 mg/5 ml          | (*) |

(\*) Disponibilidad obligatoria para pacientes derivados desde la especialidad.

(&) GES Alcohol y Drogas en menores de 20 años

#### 1.5. Anticonvulsivantes

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| Acido valproico  | comp. recubiertos 200 mg, sol. oral 10 mg/ gts | (&) |
|                  | sol oral 250 mg /5 ml                          | (&) |
| Carbamazepina    | comp. 200 mg                                   |     |
| Diazepam         | sol. inyect. 10 mg/ ml, amp. 2 ml              | (°) |
| Fenitoína sódica | comp. 100 mg                                   |     |
| Fenitoína        | sol. Inyec. 250 mg / 5 ml                      | (#) |
| Fenobarbital     | comp. 15 mg - 100 mg                           |     |
| Lamotrigina      | comp 50 y 100 mg                               | (&) |
| Levetiracetam    | comp 500 mg                                    | (&) |

(&) GES Epilepsia, derivados de la especialidad

(°) Uso exclusivo en Atención de Urgencia

(#) Carro de paro

#### 1.6. Analgésicos narcóticos

|           |  |          |
|-----------|--|----------|
| Fentanilo | sol. inyec. 0,1 mg/ml (#)                              |          |
| Morfina   | sol. inyec. 10 mg/ml - 20 mg/ml amp. 1 ml (como clorh) | (&)      |
|           | gotas 1%, cp liberación prolongada 10, 30 y 60 mg      | (&)      |
| Codeína   | sol. Oral 6%   | (&)      |
| Tramadol  | cm 150 mg acción retardada, gotas 100 mg/ml            | (&) (**) |

(\*\*) **Artrosis GES** Tratamiento de Artrosis Cadera y/o rodilla leve o moderada 55 años y más, uso según guía clínica

(&) Utilizados en pacientes incorporados al Programa GES AD y CP

(#) Utilizado en Servicio de Urgencia y carro de paro.

#### 1.7. Antidepresivos

|               |                 |     |
|---------------|-----------------|-----|
| Amitriptilina | gragea 25 mg.   |     |
| Imipramina    | gragea 25 mg.   |     |
| Fluoxetina    | cap. 20 mg.     | (&) |
| Sertralina    | comp.50 y100 mg | (&) |
| Venlafaxina   | comp 75 mg      | (&) |

(&) Utilizados en GES Depresión

#### 1.8. Medicamentos utilizados en el tratamiento del alcoholismo

|             |               |  |
|-------------|---------------|--|
| Disulfiramo | comp. 500 mg. |  |
|-------------|---------------|--|

## GRUPO 2

### ANALGESICOS - ANTIPIRETICOS - ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES Y PARA EL TRATAMIENTO DE LA GOTA.

#### 2.1. Antiinflamatorios no esteroideos - Analgésicos no opiáceos

|                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| Acido acetilsalicílico | comp. 100 mg  |     |
| Acido acetilsalicílico | comp. 500 mg  | (#) |
| Acido Mefenámico       | comp. 250 mg y 500 mg   |     |
| Celecoxib              | comp. 200 mg  | (&) |
| Clonixinato de lisina  | 100 mg y 200 mg ampolla   |     |
| Diclofenaco sódico     | sol. inyec. 25 mg/ml amp. 3 ml, comp. o gg.25 mg - 50 mg, supos. 12,5 mg.                           |     |
| Ibuprofeno             | comp. 200 y 400 mg., susp. oral 100 mg y 200 mg/5 ml  |     |
| Ketoprofeno            | sol inyec.100 mg  | (°) |
| Ketorolocaco           | sol inyec.30 mg/2ml   | (°) |
| Meloxicam              | comp 15 mg  | (*) |
| Metamizol sódico       | comp. 300mg, sol. inyec.0,5mg/ml, amp.2 ml iv, sup.250 mg   |     |
| Paracetamol            | comp. 80 mg - 160 mg – 500mg, sol. gts. orales 100 mg/ml ; supos.125 mg y 250 mg ; jbe 120 mg/5 ml. |     |
| Piroxicam              | comp. 20 mg.  |     |

(&) Tratamiento de Artrosis Cadera y/o rodilla leve o moderada 55 años y más, uso según guía clínica

(\*) Uso según protocolo Servicio de Salud

(°) Uso exclusivo en Servicio de Urgencia

(#) Carro de paro

## GRUPO 3

### MEDICAMENTOS ANTIALERGICOS Y UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA

#### 3.1. Antihistamínicos H1

|               |   |
|---------------|---|
| Clorfenamina  | comp. 4 mg, jbe. 2,5 mg/ 5 ml, sol.inyec.10 mg/ml amp. 1 ml |
| Desloratadina | comp 5 mg   |
| Loratadina    | comp. 10 mg, jbe. 5 mg/5 ml                                 |

#### 3.2. Adrenérgicos

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Epinefrina clorh. | sol. inyec. 1 mg/ ml amp. 1 ml (#) |
| Norepinefrina     | sol. inyec. 4 mg/4ml (#) (&)       |

(#) Uso en stock de urgencia

(#) (&) Uso en stock de urgencia y carro de paro

## GRUPO 4

### ANTIDOTOS Y OTRAS SUSTANCIAS UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Carbón activado      | polvo envase 50 g.           |
| Cloruro de obidoxima | sol. Inyec. 250 mg/ ml (&)   |
| Flumazenil           | sol. Inyec. 0.5 mg/ 5 ml (#) |
| Naloxona             | sol. Inyec. 0,4 mg/ml (#)    |
| N – Acetilcisteína   | sol. oral 100 mg/ 5 ml (#)   |

(&) Uso en carro de paro

(#) Uso en Servicio de Urgencia

## GRUPO 5

### ANTIBIOTICOS

#### 5.1. Aminoglucósidos

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gentamicina (c/ sulfato) | sol. inyec. 40 mg/ml amp. o fco. amp. 2 ml, sol. oft. 3 mg/ml fco. 5 ml ung. oftálmico 3 mg/g, pommo 3,5 g. |
|--------------------------|---|

#### 5.2. Macrólidos

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Eritromicina etilsuccinato | comp. 500 mg, susp. oral 200 mg/5 ml, susp. oral 400 mg/5ml |
| Claritromicina             | comp. 500 mg (&)  |
| Claritromicina             | polvo p/susp. Oral 250 mg/5 ml                              |
| Azitromicina               | cáps. 500 mg (#)  |

(&) GES NAC 65 años y más

(#) Uso en ITS

#### 5.3. Betalactámicos

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Amoxicilina               | cáps y comp 500 mg, susp. 250 mg/5 ml, susp. 500 mg/5ml   |
| Amoxicilina + clavulanato | comp: amoxicilina 500mg + clavulanto de K 125 mg (#)(&)<br>comp: amoxicilina 500mg + clavulanto de K 125 mg (#) (&)<br>susp amoxicilina 250mg + clavulanato de K 62,5mg/5ml (#)<br>susp amoxicilina 500mg + clavulanato de K 62,5mg/5ml (#) |
| Ceftriaxona               | sol. inyec. 1 gr (*)  |
| Cloxacilina sódica        | cáps. 250 mg, comp. 500 mg.   |
| Flucloxacilina            | jarabe 250 mg / 5 ml  |
| Penicilina sódica         | polvo para sol. inyec. 1.000.000 UI fco. amp.-<br>2.000.000 UI fco. amp   |
| Penicilina G Benzatina    | polvo para sol. inyec. 1.200.000 UI fco. amp.   |

(&) GES NAC 65 años y más

(#) Uso restringido y como 2º alternativa a la amoxicilina

(\*) Uso en ITS

#### 5.4. Otros antibióticos

Tetraciclina clorh. cáps. 250 mg.

#### 5.5. Sulfonamidas

Cotrimoxazol Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg; comp.  
Sulfametoxazol 200 mg + Trimetoprima 40 mg/5 ml s. oral  
Cotrimoxazol Fte. Sulfametoxazol 800mg + Trimetoprima 80mg; comp.  
Sulfametoxazol 200mg + Trimetoprima 40mg/5 ml, s. oral.

#### 5.6. Amfenicoles

Cloramfenicol cáps. 250 mg - 500 mg, jbe. 125 mg/ 5 ml (c/ palmitato)  
sol. oft. 0,5% (5 mg/g.), fco. 10 ml., ungu. oft. 10 mg/ g,  
pomo 3,5 g.

#### 5.7. Cefalosporinas

Cefadroxilo cáps. 500 mg, susp. oral 250 mg/ 5 ml (°)

(°) Uso restringido y según norma técnica definida por el Director del establecimiento.

#### 5.8. Quinolonas

Ciprofloxacino comp. 500 mg (como clorhidrato)

#### 5.9. Antifúngicos

Clotrimazol crema 1% (10 mg/ g), ov. vaginales 100 mg  
Fluconazol comp. 150 mg  
Griseofulvina comp. 125 mg - 500 mg.  
Ketoconazol comp. 200 mg  
Nistatina pomada 100.000 UI/ g.  
Terbinafina comp. 250 mg

#### 6.0. Antivirales

Aciclovir comp 200 y 400 mg , susp. oral 200/5 mg  
Oseltamivir cp 75 mg y susp oral 12 mg/ml (#)  
Zanamivir inhalador (#)

(#) Uso de acuerdo a Guía Clínica Influenza Minsal

## GRUPO 6

### MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL APARATO DIGESTIVO

#### 6.1. Antiácidos, inhibidores de la secreción ácida, antiulcerosos

|                        |                                  |     |
|------------------------|----------------------------------|-----|
| Aluminio hidróxido gel | comp. 500 mg, susp. oral 6%      |     |
| Famotidina             | comp. 40 mg.                     |     |
| Ranitidina             | comp. 300 mg                     |     |
| Ranitidina             | amp 150 mg                       | (#) |
| Omeprazol              | comp. 20 mg                      | (&) |
| Omeprazol              | polvo p/ sol. inyec. 40 mg/10 ml | (#) |

(&) Tratamiento concomitante con AINE utilizados en GES Artrosis

(#) Uso en Servicio de Urgencia

#### 6.2. Antieméticos

|                      |  |     |
|----------------------|--|-----|
| Domperidona          | comp. 10 mg, supos. 30 mg, sol. gts. orales 1 mg/ 10 gts     |     |
| Metoclopramida clor. | comp. 10 mg., sol. gts. orales 2 mg/ml, sol. Iny. 10 mg/2 ml |     |
| Ondasentrón          | sol. inyec. 4 mg/2 ml  | (#) |
| Tietilperazina       | comp. 6,5 mg,  |     |
| Tietilperazina       | sol. inyec. 6,5 mg/1 ml                                      | (#) |

(#) Uso en stock de urgencia

#### 6.3. Antiespasmódicos

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Atropina sulfato | sol. inyec. 1 mg/ ml, amp. 1 ml                             |  |
| Propinoxato      | comp. 5 mg, sol. oral gts. 5 mg/ml, sol. iny. 1 mg/ ml amp, |  |
|                  | supos. 10 mg.   |  |
| Papaverina       | 80mg/2ml amp.   |  |

#### 6.4. Estimulantes de la evacuación intestinal y catárticos

|                  |                       |     |
|------------------|-----------------------|-----|
| Enema evacuante  | solución              | (&) |
| Lactulosa        | solución al 65%       | (&) |
| Vaselina líquida | 100% (aceite mineral) | (&) |

(&) GES PAD Y CP

#### 6.5. Medicamentos utilizados en la diarrea

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Sales rehidratación oral | sol. oral-contenido p/preparar 250 ml de 60 mEq sodio.<br>sodio cloruro 0,45 g., citrato trisódico dehid. 0,735 g.,<br>potasio cloruro 0,375 g. glucosa anhidr. 5 g. |  |
|--------------------------|--|--|

6.6. Antibióticos y quimioterápicos

Furazolidona comp. 100 mg, susp.fte. oral 50 mg/5ml  
Nitrofurantoína macrocris. comp. 100 mg, susp. oral 25 mg/ 5 ml

6.7. Antiparasitarios

Mebendazol comp. 100 mg , s.oral 100 mg/5ml  
Metronidazol comp. vagin. 500 mg, comp. 250 mg, comp 500 mg,  
Nifurtimox comp 120 mg (#)  
Tinidazol susp. oral 125 mg/5ml  
comp. 500 mg, susp. oral. 500 mg/ 5ml

(#) Medicamento utilizado en la enfermedad de chagas , distribuído sólo por la DSS

**GRUPO 7**

**MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN EL APARATO CARDIOVASCULAR**

7.1. Antianginoso

Diltiazem comp 60 mg (&)  
Isosorbide dinitrato comp. sublingual 5 mg, comp. 10 mg.  
Nitroglicerina comp. 0,6 mg y sol. inyec. 50 mg/10 ml (#)  
Propranolol sol. inyec. 1 mg/ml (\*)  
Verapamilo comp 80 y 120 mg (&)  
Verapamilo sol. inyec. (\*)

(&) GES Diabetes Mellitus tipo 2 segundo año.

(#) Uso en stock de urgencia.

(\*) Uso en carro de paro

7.2 Antiarrítmico

Adenosina sol. inyec. 6mg/ 2 ml (#)  
Amiodarona sol. inyec. 150mg/3ml (#)

(#) Uso en carro de paro

### 7.3 Antihipertensivos

|                   |   |     |
|-------------------|---|-----|
| Amlodipino        | comp. 5 mg - 10 mg                        |     |
| Atenolol          | comp. 50 mg - 100 mg                      |     |
| Captopril         | comp. 25 mg                               | (#) |
| Carvedilol        | comp. 12,5 mg – 25 mg                     |     |
| Enalapril         | comp. 5mg - 10 mg - 20 mg                 |     |
| Labetalol         | sol. inyec. 30 mg/2 ml                    | (#) |
| Losartán          | comp. 50 mg                               | (&) |
| Metildopa         | comp. 250 mg.                             |     |
| Nifedipino        | comp. 10 mg., comp. acción retard. 20 mg. |     |
| Nitrendipino      | comp. 20 mg.                              |     |
| Propranolol clorh | comp. 40 mg.                              |     |

(&) GES Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión en > de 15 años y más

(#) Uso en Urgencia

### 7.4 Glucósidos cardíacos

|              |                                  |     |
|--------------|----------------------------------|-----|
| Lanatósido C | sol. inyec. 0,2 mg/ml, amp. 2 ml | (#) |
| Digoxina     | comp. 0,25 mg.                   |     |

(#) Uso sólo en stock de urgencia

### 7.5. Diuréticos

|                                 |  |     |
|---------------------------------|--|-----|
| Acetazolamida                   | comp. 250 mg.                                      |     |
| Espironolactona                 | comp. 25 mg.                                       |     |
| Furosemida                      | comp. 40 mg.,<br>sol. inyec. 20 mg/ml, amp. 1 ml   | (#) |
| Hidroclorotiazida               | comp. 50 mg.                                       |     |
| Hidroclorotiazida + Triamterene | Hidroclorotiazida 25 mg - Triamterene 50 mg, comp. |     |
| Manitol                         | sol. inyec. 15%                                    | (&) |

(#) Uso sólo en stock de urgencia

(&) Uso en carro de paro

## GRUPO 8

### Antiparkinsonianos

|                      |                           |     |
|----------------------|---------------------------|-----|
| Levodopa Benserazida | comp 250/25               | (&) |
| Levodopa Carbidopa   | comp. 200/25              | (&) |
| Pramipexole          | comp. 0,25 y 1 mg         | (&) |
| Quetiapina           | comp 25 mg (en < 60 años) | (&) |
| Trihexifenidilo      | comp 2 mg                 | (&) |

(&) Utilizados en pacientes GES derivados de la especialidad, medicamentos despachados desde la Dirección de Servicio según disponibilidad.



## GRUPO 9

### MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS

#### 9.1 Antimicóticos y antiprotozoarios

|              |   |
|--------------|---|
| Clotrimazol  | crema 1% (10 mg/ g)   |
| Nistatina    | pomada 100.000 UI/g, comp. vag. 100.000 UI, susp. oral<br>100.000 UI/ml |
| Metronidazol | gel o crema tópica 0,75%  |

#### 9.2 Antiinflamatorios

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Adapaleno      | gel o crema (#)                   |
| Betametasona   | crema 0,1% (1mg/g como valerato.) |
| Clobetasol     | ungüento tópico 0,05% (#)         |
| Hidrocortisona | crema tópica 1% (#)               |

Uso exclusivo en teledermatología (#)

#### 9.3. Escabicidas y pediculicidas

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Crotamitón        | crema o loción tópica 10% |
| Permetrina        | shampoo y loción          |
| Vaselina azufrada | crema                     |

#### 9.4 Cicatrizantes

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Oxido Zinc 25 g. | pomada 100 g. |
| Almidón 25 g.    | pomada 100 g. |
| Lanolina 25 g.   | pomada 100 g. |
| Vaselina 25 g.   | pomada 100 g. |

## GRUPO 10

### DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Alcohol              | gel con glicerina o lanolina<br>70° o 95 °                                  |
| Clorhexidina         | sol. Uso tópico 4%  |
| Clorhexidina         | 0,12% colutorio dental (&)  |
| Hipoclorito de sodio | sol. 10%  |
| Nitrofurazona        | sol. uso tópico 0,2%  |
| Povidona yodada      | sol. 10%  |
| Triclosan            | jabón líquido 2% con dispensador no recargable<br>con glicerina o lanolina. |

(&) GES Urgencia Odontológica y Salud Oral en la Embarazada

## GRUPO 11

### HORMONAS Y OTROS MEDICAMENTOS ENDOCRINOS Y ANTICONCEPTIVOS

#### 11.1 Medicamentos utilizados en alteraciones de las gónadas

##### 11.1.1 Medicamentos Estrógenos

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Estrógenos conjugados | comp. 0,625 mg.                              |
| Etinilestradiol       | comp. 0,02 mg.                               |
| Estradiol micronizado | comp. 1 mg ( Programa Climaterio)            |
| Estradiol             | gel tópico tubo 0,5mg ( Programa Climaterio) |
| Tibolona              | comp. recubierto 2,5 mg                      |

##### 11.1.2 Progestinas

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Medroxiprogesterona      | comp. 5 mg.                                    |
| Nomegestrol              | comp. recubierto 5 mg (Programa Climaterio)    |
| Progesterona             | sol. iny. oleosa 25 mg/ml, amp. 2 ml           |
| Progesterona micronizada | cápsula 100 mg y 200 mg ( Programa Climaterio) |

##### 11.1.3 Anticonceptivos

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anovulatorios                   | comp. 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 mg.        |
| Medroxiprogesterona Acetato     | susp. inyec. jeringa prellenada 104 mg/ 0,65 ml |
| Medroxiprogesterona Acetato     | susp. inyect. 150 mg                            |
| Medroxiprogesterona / Estradiol | susp. inyect. 25/5 mg                           |
| Etonorgestrel                   | Implante subcutáneo 68 mg.                      |
| Levonorgestrel                  | comp. 0,03 mg                                   |
|                                 | comp 0,75 y 1,5 mg (#)                          |

(#) Uso de acuerdo a Norma Ministerial

## GRUPO 12

### 12. MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA SUPRARENAL

#### 12.1 Glucocorticoides

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Betametasona fosf. disódico | sol. inyec. 4 mg/ml , amp. 1 ml.               |
| Hidrocortisona succinato    | polvo p/sol. inyec. 100 mg - 500 mg, fco. amp. |
| Dexametasona fosf. sódico   | sol. inyec. 4 mg/ml, amp. 1 ml.                |
| Prednisona                  | comp. 5 mg,, susp.oral 1 mg/ml y 20 mg/5ml     |

## GRUPO 13

### 13.1. MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Metformina clorh.       | comp. 850 mg.   |
| Clorpropamida           | comp. 250 mg.   |
| Glibenclamida           | comp. 5 mg.   |
| Insulina isofana humana | susp. inyec .NPH,100 UI/ml, fco. amp. 10 ml<br>cristalina 100 UI/ ml, fco. amp. 10 ml (#) |
| Tolbutamida             | comp. 500 mg.   |

(#) Uso en el stock de Urgencia

## GRUPO 14

### 14.1. MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA TIROIDES

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Levotiroxina sódica | comp 100 mcg. |
|---------------------|---------------|

## GRUPO 15

### MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN EL SISTEMA NEUROVEGETATIVO Y MUSCULO LISO

#### 15.1 Simpaticomiméticos o adrenérgicos

|                     |                              |       |
|---------------------|------------------------------|-------|
| Adrenalina racémica | sol.para nebulizar 2,25%     | (&)   |
| Efedrina            | amp. 6%                      | (+)   |
| Epinefrina clorh.   | sol. iny. 1 mg/ml, amp. 1 ml | (+)   |
| Fenoterol           | sol. iny. 0,5mg/10 ml        | (+)   |
| Metilfenidato       | comp.10 mg                   | (#)   |
| Anfetamina          | comp. 10 mg                  | (# #) |

(#) Disponibilidad obligatoria en pacientes pediátricos TDA

(# # ) Uso excepcional , ante efectos adversos con metilfenidato.

(+) Uso sólo en stock de urgencia

(&) Tratamiento IRA Baja manejo ambulatorio en el menor de 5 años.

#### 15.2. Parasinfaticolíticos o anticolinérgicos

|                  |                                 |     |
|------------------|---------------------------------|-----|
| Atropina sulfato | sol. inyec. 1 mg/ml, amp. 1 ml. | (+) |
|------------------|---------------------------------|-----|

(+) Uso sólo en stock de urgencia

## GRUPO 16

### PRODUCTOS UTILIZADOS EN OFTALMOLOGIA

#### 16.1. Anestésicos locales

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Proparacaína. | sol. oftálmica 5% |
|---------------|-------------------|

## GRUPO 17

### VITAMINAS Y MINERALES

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Acido fólico          | comp. 1 mg.  |
| Acido fólico          | comp. 5 mg.  |
| Cianocobalamina       | sol. iny. 0,1 mg/ml, amp. 1 ml   |
| Ferroso sulfato       | comp. 200 mg, sol. oral gts. 125 mg/ml   |
| Fitomenadiona         | sol. iny. 10 mg/ml, amp. 1 ml.   |
| Piridoxina clorh.     | sol. inyec. 100 mg/ml, amp. 1 ml.  |
| Tiamina clorh.        | sol. inyec. 100 mg/ml, 1 ml.   |
| Polivitamínicos A-C-D | gts. que contienen por 10 ml: Palmitato retinol 1,375 mg, Ergocalciferol 0,0125 mg, Acido ascórbico 37,5 mg. |

## GRUPO 18

### MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN EL APARATO RESPIRATORIO FARMACOS UTILIZADOS EN LA OBSTRUCCION BRONQUIAL

#### 18.1 No agonistas

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Salbutamol               | susp. p/inhalación oral 100 mcg/dosis, aerosol dosificador   |
| Budesonida               | susp. p/inhalación oral 200 mcg/dosis, aerosol dosificador   |
| Ipratropio Bromuro       | susp. p/inhalación oral 20 mcg/dosis, aerosol dosificador  |
| Salmeterol + Fluticasona | susp. p/inhalación oral 25/125 mcg/dosis, aerosol dosificador<br>susp. p/inhalación oral 25/250 mcg/dosis, aerosol dosificador |

Medicamentos GES IRA ERA,EPOC, inhaladores despachados por Servicio de Salud según disponibilidad

|                                |   |     |
|--------------------------------|---|-----|
| Fenoterol + Ipratropio Bromuro | solución p/ nebulizar 0,5 mg/0,25 mg/ dosis | (#) |
| Salbutamol                     | solución p/ nebulizar 5 mg/ml               | (#) |

(#) Uso en servicio de urgencia.

#### 18.1 Xantinas

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Aminofilina | sol. inyec. 250 mg/10 ml. (&) |
|-------------|-------------------------------|

(&) Uso en stock de urgencia

## GRUPO 19

### 19.1. ANTITUBERCULOSOS

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Cicloserina   | cp. 250 mg.                        |
| Estreptomina sulfato                                | polvo p/sol. inyec. 1 g, fco. amp. |
| Etambutol clorh.                                    | comp. 200 mg.                      |
| Etionamida  | comp. 250 mg.                      |
| Isoniacida  | comp. 100 mg.                      |
| Pirazinamida  | comp. 500 mg.                      |
| Rifampicina   | cp. 150 mg                         |
| Rifampicina + Isoniazida                            | comp. 150/150 mg                   |
| Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol | comp 150/75/400/275 mg             |

## GRUPO 20

### MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CORREGIR PERTURBACIONES DE LA COMPOSICION DEL MEDIO INTERNO

#### 20.1 Antigotosos

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Alopurinol | comp. 100 mg –300 mg |
| Colchicina | comp. 0,5 mg         |

#### 20.2 Azúcares

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Glucosa sol. isotónica   | sol. inyectable 5%  |
| Glucosa sol. isotónica   | sol. inyectable 10% |
| Glucosa sol. hipertónica | sol. inyectable 30% |

Uso en servicio de Urgencia y carro de paro.

#### 20.3 Electrolitos

|                               |   |         |
|-------------------------------|---|---------|
| Calcio carbonato + vitamina D | cáps. o comp.500 mg/400 UI                          |         |
| Calcio gluconato              | sol. iny. 10% amp 10 ml, granulado 10%              | (#)     |
| Magnesio sulfato              | sol. iny. 25%, amp. 5 ml.                           | (#)     |
| Potasio cloruro               | sol. iny. 10%, amp. 10 ml,<br>gg. acc. sost. 600 mg | (#)     |
| Potasio gluconato             | elixir al 31,2%                                     |         |
| Sodio bicarbonato             | sol.iny. 2/3M                                       | (#) (&) |
| Sodio cloruro                 | sol. inyec. 0,9% amp. 500 ml.                       | (#)     |
| Sodio cloruro                 | sol. inyectable 10%                                 | (#) (&) |

(#) Uso sólo en stock de urgencia.

(&)Uso en carro de paro

## 21 ENZIMAS TROMBOLITICAS

|                 |                        |     |
|-----------------|------------------------|-----|
| Estreptoquinasa | fco amp 1.500.000 U.I. | (&) |
|-----------------|------------------------|-----|

(&) Tratamiento de Urgencia del IAM en Hospitales de Baja Complejidad , SAPU y SUR

## 22 TRATAMIENTO DE LAS DISLIPIDEMIAS

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Atorvastatina | comp 10 mg y cm 20 mg   |
| Lovastatina   | comp 20 mg              |
| Gemfibrozilo  | comp 300 mg y cm 600 mg |

## 23 MEDICAMENTOS USADOS EN TRANSTORNOS SANGUINEOS

### Anticoagulantes y antagonistas

|                   |                           |         |
|-------------------|---------------------------|---------|
| Clopidrogel       | comp. 75 mg y 300 mg      | (& y #) |
| Acido Tranexámico | sol. inyec. 1000 mg/10 ml | (& y #) |
| Heparina          | sol.inyec. 5000 UI/ml     | (#)     |

(&) Uso en carro de paro

(#) Uso en Servicio de Urgencia

**24 MEDICAMENTOS USADOS EN TRANSTORNOS SANGUINEOS**  
**Productos sanguíneos y sucedáneos del plasma**

Almidón hidroxietílico expandidor plasmático      sol. inyec. 6%

(&) Uso en carro de paro